



Układ oddechowy

Prezentacja jest objęta prawem autorskim i podlega ochronie prawnej przed kopiowaniem na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.



BUDOWA UKŁADU ODDECHOWEGO



Pobrano: root@localhost 6.06.2026

UKŁAD ODDECHOWY



Funkcja układu oddechowego to dostarczenie **tłenu** do organizmu, niezbędnego do uzyskania *energii* użytecznej biologicznie w procesie oddychania komórkowego tlenowego [rozkład związków złożonych do prostszych].

Część energii rozprasza się w postaci *ciepła*, a część zostaje związana w ATP




UKŁAD ODDECHOWY

**WAŻNE
DO MATURY!**




Wymiana gazowa i wentylacja to nie to samo!

- ❑ wentylacja płuc → pobieranie i usuwanie powietrza z płuc
- ❑ wymiana gazowa → wymiana gazów oddechowych: O_2 i CO_2 pomiędzy krwią a pęcherzykami płucnymi lub komórkami ciała



mitochondrium




UKŁAD ODDECHOWY



Cechy powierzchni wymiany gazowej:

- ❑ wilgotna → wilgotna powierzchnia wymiany gazowej pozwala na rozpuszczenie się gazów oddechowych, przez co dyfuzja zachodzi sprawniej
- ❑ różnica ciśnień parcjalnych → wymiana gazowa zachodzi na zasadzie dyfuzji z większego ciśnienia parcjального gazu do mniejszego
- ❑ duża powierzchnia → im bardziej pofałdowana struktura, przez którą zachodzi dyfuzja gazów oddechowych, tym większa powierzchnia wymiany gazowej

BUDOWA UKŁADU ODDECHOWEGO




Drogi oddechowe [transport powietrza]

- ☐ górne:
 - jama nosowa
 - gardło
- ☐ dolne:
 - krtąń
 - tchawica
 - oskrzela

Płuca pęcherzykowe [wymiana gazowa]

JAMA NOSOWA




Jama nosowa → podzielona na dwie części przez przegrodę nosa.

W jamie nosowej powietrze podlega:


- ❑ ogrzaniu → silne unaczynienie [krew jest nośnikiem ciepła i oddaje je powietrzu]
- ❑ nawilżeniu → śluz [komórki kubkowe błony śluzowej wydzielają śluz]
- ❑ oczyszczeniu → rzęski [ruch rzęsek przesuwania zanieczyszczenia: nabłonek migawkowy]

W jamie nosowej znajduje się pole węchowe odbierające wrażenia węchowe.


NABŁONEK JAMY NOSOWEJ



NABŁONEK JAMY NOSOWEJ



GARDŁO




Wspólny element układu pokarmowego i oddechowego. [układ oddechowy powstaje z prajelita].

Powietrze z jamy nosowej przedostaje się do gardła a następnie krtani.

NAGŁOŚNIA





Jedną z chrząstek krtani - **nagłośnia** - obniża się podczas połykania, zamykając drogę do układu oddechowego chroniąc w ten sposób przed przedostaniem się do niego cząstek pokarmu.



Położenie nagłośni (1) przy wdechu (A) i podczas jedzenia (B)

KRTAŃ



Krtień → 9 chrząstek połączonych mięśniami i więzadłami [dużo kolagenu]


KRTAŃ




Elementem krtani jest **głośnia**, która jest narządem głosu.

Tworzą ją *fałdy głosowe*, drgające pod wpływem przepływającego powietrza, i szpara głośni.


milczenie



szeptanie



mówienie




Milczenie: fałdy głosowe są rozluźnione, powietrze swobodnie przepływa

Mówienie: fałdy głosowe są napięte, podczas wydechu powietrza szpara głośni jest zamknięta powietrze wprawia w drgania fałdy głosowe, powodując powstanie dźwięku

→ na wysokość głosu wpływa długość i grubość oraz napięcie fałdów głosowych

→ na barwę głosu wpływają puste przestrzenie w kościach czaszki np. zatoki

TCHAWICA



Prawe oskrzele
krótsze i grubsze
→ częstsze stany
zapalne

Tchawica → kilkunastocentymetrowy przewód zbudowany z chrząstek połączonych więzadłami, transportujący i oczyszczający powietrze - rzęski przesuwają zanieczyszczenia do gardła - tam są połykane / odkrztuszone.

Między chrząstkami znajduje się tkanka łączna właściwa i tkanka mięśniowa gładka, co zapobiega zapadaniu się → drożność

W dolnej części tchawica rozgałęzia się na 2 oskrzela: prawe i lewe

TCHAWICA




komórka kubkowa światło tchawicy rzęski



nabłonek wielorzędowy walcowaty

gruczoł w błonie podśluzowej

OSKRZELA





Oskrzela → przewody wnikające do płuc tworząc **drzewo oskrzelowe**.

Główne → płatowe [3 prawe, 2 lewe] → segmentowe → oskrzeliki końcowe → oskrzeliki oddechowe - w ich ścianach znajdują się pęcherzyki płucne


Ściany oskrzelików nie posiadają chrząstek i gruczołów, a są wzmocnione tylko tkanką mięśniową gładką.

OSKRZELIKI




Oskrzela i oskrzeliki posiadają rzęski, które pomagają usuwać śluz i inne cząsteczki z płuc

PŁUCA



Pobrano: root@Inp... 6.06.2026

PŁUCA




Płuca to parzyste narządy w kształcie stożka położone w klatce piersiowej, na przeponie. Mają płatową budowę - prawe ma 3 płaty, a lewe 2 ze względu na miejsce dla serca.

Płuca pęcherzykowate → narządy wymiany gazowej między powietrzem a krwią. Zbudowane z pęcherzyków płucnych znacznie zwiększających *powierzchnię* dyfuzji gazów oddechowych.

Płuca okryte są błoną łącznotkankową → **opłucną**: płucna i ścienna, między którymi znajduje się jama opłucnej [ujemne ciśnienie] z płynem surowiczym - zmniejsza tarcie i chroni przed zapadaniem pęcherzyków

KLATKA PIERSIOWA





PŁUCA




Ściany pęcherzyków płucnych zbudowane są z nabłonka **jednowarstwowego płaskiego** ułatwiającego dyfuzję gazów.

Pory łączące sąsiadujące pęcherzyki umożliwiają przepływ powietrza między nimi, otoczone gęstą siecią naczyń krwionośnych - duża powierzchnia wymiany gazowej



NACZYNNIA WŁOSOWATE PŁUC




NABŁONEK PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH




Wyściółka pęcherzyków płucnych składa się z:

- ❑ pneumocytów typu I - spłaszczone komórki - zachodzi przez nie dyfuzja gazów oddechowych między światłem pęcherzyków płucnych a krwią naczyń włosowatych
- ❑ pneumocytów typu II - produkcja surfaktantu do światła pęcherzyka płucnego

Surfaktant → związek powierzchniowo czynny [lipidowo-białkowy] pokrywający wewnątrz pęcherzyków płucnych - obniża napięcie powierzchniowe *chroniąc przed ich zapadaniem i sklejeniem.*



PĘCZERZYKI PŁUCNE




pneumocyt typu II

- pory
- włośniczka
- błona
- pneumocyt typu I
- makrofag
- przestrzeń wypełniona powietrzem


Alveolus

- pęcherzyki płucne
- przewód pęcherzykowy
- naczynia krwionośne
- światło oskrzelika



grono pęcherzyków płucnych

PRZEPONA



przepona

Przepona - mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej zbudowany z tkanki poprzecznie prążkowanej szkieletowej.

Podczas wdechu przepona kurczy się i obniża, zwiększając objętość klatki piersiowej umożliwiając zassanie powietrze do płuc.




FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO

Pobrano: root@localhost 6.06.2026

BARIERA POWIETRZE-KREW




Bariera powietrze-krew składa się z pneumocytów typu I, błony podstawnej i komórek śródbłonka wyściełających naczynia włosowate - bariera ta umożliwia wymianę gazową - cząsteczki tlenu dyfundują z pęcherzyków do krwi, a dwutlenek węgla w przeciwnym kierunku.



WENTYLACJA PŁUC



Wymiana powietrza pomiędzy płucami a środowiskiem zewnętrznym umożliwiona za pomocą naprzemiennych wdechów i wydechów.



Biorą w niej udział mięśnie oddechowe:


- ❑ międzyżebrowe: znajdują się pomiędzy żebrami
- ❑ przepona: odziela klatkę piersiową od jamy brzusznej

zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej


WENTYLACJA PŁUC




mięśnie
międzyżebrowe



przepona



WENTYLACJA PŁUC - WDECH




Wdech (wymaga **ATP** do skurczu mięśni - akt czynny):

Skurcz mięśni międzyżebrowych i przepony [przepona obniża się i spłaszcza, żebra unoszone są ku górze i na boki] → zwiększenie objętości klatki piersiowej → zwiększenie objętości płuc → zassanie powietrza do płuc w wyniku wytworzonego *podciśnienia*

WENTYLACJA PŁUC - WDECH




wyższe ciśnienie



niższe ciśnienie

Zwiększenie objętości klatki piersiowej prowadzi do powstania **podciśnienia** w pęcherzykach płucnych, czyli ciśnienia mniejszego o 2-3 mmHg niż powietrze atmosferyczne - jest to przyczyną napływu powietrza do płuc

WENTYLACJA PŁUC - WYDECH




Wydech (akt bierny - mięśnie nie pracują aktywnie):

Rozkurcz mięśni międzyżebrowych i przepony [przepona podnosi się, żebra opadają] → zmniejszenie objętości klatki piersiowej → zmniejszenie objętości płuc → usunięcie powietrza z płuc w wyniku wytworzonego *nadciśnienia*

WENTYLACJA PŁUC - WYDECH




nizsze ciśnienie



wyższe ciśnienie

Zmniejszenie objętości klatki piersiowej prowadzi do powstania **nadciśnienia** w pęcherzykach płucnych, czyli ciśnienia wyższego o 2-3 mmHg niż powietrze atmosferyczne - jest to przyczyna wypływu powietrza z płuc

POJEMNOŚĆ PŁUC



REGULACJA CZĘSTOŚCI ODDECHÓW




Ośrodek oddechowy znajdujący się w rdzeniu przedłużonym kontroluje wentylację płuc.

Głównym ośrodkiem oddechowym jest ośrodek *wdechu*. Impulsy nerwowe wysyłane z tego ośrodka motoneuronami pobudzają mięśnie *oddechowe* do skurczu, dzięki czemu następuje wdech. Pod koniec każdego wdechu, ośrodek pneumatyczny czasowo hamuje aktywność neuronów odpowiedzialnych za inicjację wdechu, co umożliwia rozluźnienie mięśni wdechowych i wykonanie wydechu.


Ośrodek *wydechu* bierze udział jedynie w wydechach aktywnych, np. podczas kaszlu.

REGULACJA CZĘSTOŚCI ODDECHÓW



Ośrodek reaguje głównie
na zwiększone stężenie
 CO_2 we krwi.

REGULACJA CZĘSTOŚCI ODDECHÓW



REGULACJA CZĘSTOŚCI ODDECHÓW





Chemoreceptory aorty, tętnicy szyjnej i pnia mózgu reagują na *obniżone pH* krwi [spowodowane wzrostem stężenia CO₂] pobudzając ośrodek oddechowy [ośrodek wdechu wysyła impulsy nerwowe do mięśni międzyżebrowych i przepony, pobudzając je do skurczu] - w konsekwencji zwiększa się częstość i głębokość oddechów.

Dwutlenek węgla obecny we krwi reaguje z wodą tworząc kwas węglowy dysocjujący na protony oraz jony wodorowęglanowe.



Zwiększenie stężenia jonów H⁺
obniża pH krwi.

WYMIANA GAZOWA




O zachodzącej wymianie gazowej świadczy różny udział poszczególnych gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym.

Transport gazów zachodzi na zasadzie **dyfuzji** z miejsca o wyższym ciśnieniu parcjalnemu gazu do miejsca o niższym ciśnieniu parcjalnemu.

ciśnienie parcjalne - ciśnienie wywierane przez jeden z gazów w mieszaninie

WYMIANA GAZOWA



Wymiana gazowa [dyfuzja gazów oddechowych zgodnie z różnicą ciśnień parcjalnych]


- 1) zewnętrzna:
pęcherzyki płucne - krew [O_2 z powietrza do krwi]
- 2) wewnętrzna:
krew - komórki [O_2 z krwi do komórek]

WYMIANA GAZOWA ZEWNĘTRZNA



W pęcherzyku płucnym ciśnienie parcjalne tlenu jest wyższe niż we krwi [krew została odtlenowana w narządach ciała], dlatego tlen dyfunduje z pęcherzyka do krwi.

W pęcherzyku płucnym ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla jest niższe niż we krwi [krew odebrała CO_2 z narządów ciała], dlatego dwutlenek węgla dyfunduje z krwi do pęcherzyka.




WYMIANA GAZOWA WEWNĘTRZNA



W krwi doływającej do narządów ciała ciśnienie parcjalne tlenu jest wyższe niż w komórkach ciała [krew została natlenowana w płucach, a w komórkach tlen jest ciągle zużywany], dlatego tlen dyfunduje z krwi do komórek ciała. W komórkach tlen jest zużywany i powstaje CO_2 .

Dlatego komórki mają wyższe ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla niż krew doływająca do narządów ciała, więc dwutlenek węgla dyfunduje z komórek do krwi.





TRANSPORT GAZÓW ODDECHOWYCH

Pobrano: root@localhost 6.06.2026

TRANSPORT TLENU





Tlen dyfunduje z pęcherzyków płucnych do osocza krwi, a następnie do wnętrza erytrocytów, gdzie łączy się nietrwale z białkiem - hemoglobina, tworząc **oksyhemoglobinę**. Bardzo niewielkie ilości tlenu transportowane są w postaci fizycznie *rozpuszczonej w osoczu*.

jedna cząsteczka hemoglobiny może przyłączyć cztery cząsteczki tlenu: $\text{Hb} + 4 \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{Hb}(\text{O}_2)_4$

Jest to proces utlenowania, nie utlenienia hemoglobiny!

HEMOGLOBINA



Hemoglobina → białko złożone odpowiedzialne za transport tlenu.

Składa się z 4 podjednostek, każda z nich zawiera cząsteczkę *hemo* z dwuwartościowym jodem żelaza Fe^{2+} , do którego *odwracalnie* wiąże się tlen, dzięki czemu może zostać odłączony od hemoglobiny w narządach ciała.

Hemoglobina transportuje też pewne ilości CO_2 .

Pochodne hemoglobiny:

- oksyhemoglobina ($\text{HbO} / \text{HbO}_2, \text{Hb}_4\text{O}_2$)
- karboksyhemoglobina (HbCO)
- karbaminohemoglobina ($\text{HbCO}_2, \text{HHbCO}_2$)


TRANSPORT DWUTLENKU WĘGLA




Dwutlenek węgla powstający w komórkach ciała dyfunduje do osocza krwi i wnika do erytrocytów. Reaguje tam z cząsteczką wody tworząc kwas węglowy [reakcję katalizuje enzym - anhidraza węglanowa]. Kwas węglowy dysocjuje na proton H^+ i jon wodorowęglanowy HCO_3^- , który dyfunduje do osocza krwi i w tej postaci CO_2 transportowany jest do płuc.

W naczyniach włosowatych płuc jon wodorowęglanowy ponownie wnika do erytrocytów, gdzie łącząc się z jonami H^+ tworzy kwas węglowy, a następnie anhidraza węglanowa przeprowadza reakcję jego rozkładu do CO_2 i H_2O . CO_2 dyfunduje do pęcherzyków płucnych i jest usuwany z wydychanym powietrzem.

TRANSPORT GAZÓW ODDECHOWYCH



TRANSPORT GAZÓW ODDECHOWYCH



TRANSPORT GAZÓW ODDECHOWYCH



Postaci transportowe tlenu:

- 1) oksyhemoglobina [połączony z hemoglobina] - 98%
- 2) fizycznie rozpuszczony w osoczu - 2%

Postaci transportowe dwutlenku węgla:

- 1) jony wodorowęglanowe HCO_3^- - 70%
- 2) karbaminohemoglobina [połączony z hemoglobina] HbCO_2 - 20%
- 3) fizycznie rozpuszczony w osoczu - 10%

KREW NATLENOWANA I ODTLENOWANA




Krew żylna - odtlenowana - brunatną,
a krew tętnicza - natlenowana - ma
jasnoczerwoną barwę.

UWAGA

Jest to krew natlenowana/ utlenowana
Nie ~~utleniona~~ → nie zmienia się
stopień utlenienia żelaza!

BIAŁKA WIAŻĄCE TLEN



Gdy krzywa dysocjacji przesunięta jest w lewo, białko trudniej oddaje tlen

Powinowactwo białek do tlenu:

- mioglobina [największe powinowactwo do tlenu]
- hemoglobina płodowa
- hemoglobina dorosłego człowieka

Wysokie powinowactwo mioglobiny do tlenu pozwala jej skutecznie *magazynować* tlen w mięśniach i uwalniać go tylko w warunkach dużego zapotrzebowania.

POWINOWACTWO HEMOGLOBINY DO TLENU



Powinowactwo hemoglobiny do tlenu zależy od różnych czynników.
Rośnie w wymienionych warunkach [tlen przyłącza się do hemoglobiny]:


- pH: wysokie
- temperatura krwi: niska
- ciśnienie parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym: wysokie
- BPG [2,3-bisfosfoglicerynian]: mniej

POWINOWACTWO HEMOGLOBINY DO TLENU



W komórkach organizmu zachodzi oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe zużywające O_2 i produkujące CO_2 . Powstające CO_2 obniża pH krwi, co ułatwia odłączenie się tlenu od hemoglobiny [a tym samym dostarczenie go do komórek - krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny przesunęła się w prawo], a przyłączenie dwutlenku węgla.

Wzrost temperatury krwi również prowadzi do zwiększenia stopnia dysocjacji oksyhemoglobiny - dochodzi do odłączenia tlenu i dostarczenia go komórkom oddychającym tlenowo.




POWINOWACTWO HEMOGLOBINY DO TLENU




Zewnętrzna wymiana gazowa - między pęcherzykami płucnymi i krwią - hemoglobina ma **większe** powinowactwo do tlenu [przyłącza tlen] na co wpływa:

- niższa temperatura
- wzrost pH
- wysokie ciśnienie parcjalne O_2
- niskie ciśnienie parcjalne CO_2



Wewnętrzna wymiana gazowa - między krwią a komórkami - hemoglobina ma **mniejsze** powinowactwo do tlenu [uwalnia tlen] na co wpływa:

- wyższa temperatura
- spadek pH
- niskie ciśnienie parcjalne O_2
- wysokie ciśnienie parcjalne CO_2



WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH



W warunkach wysokogórskich ciśnienie atmosferyczne jest niższe, przez co niższe jest ciśnienie parcjalne tlenu co utrudnia jego dyfuzję do naczyń włosowatych płuc.

W celu adaptacji przyspiesza oddech oraz wydzielana jest erytropoetyna pobudzając syntezę erytrocytów.




WPLÝW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH



Tlenek węgla [czad] - wiąże się *nieodwracalnie* z hemoglobina [karboksyhemoglobina] uniemożliwiając transportowanie tlenu. Hemoglobina ma większe powinowactwo do czadu niż do tlenu, a CO łączy się z hemoglobina trwale trwale - niedotlenienie, a w konsekwencji śmierć

Pyłowe zanieczyszczenie powietrza - drobne cząstki stałe znajdujące się w powietrzu, które osadzają się na płucach oraz mogą dostać się do krwi: pylicy płuc, większości nowotworów oraz zapalenia pęcherzyków płucnych




WPLÝW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH



Dym tytoniowy - zawiera wiele trujących oraz rakotwórczych substancji


Smog - masy zanieczyszczonego powietrza utrzymujące się przy powierzchni zawierające toksyczne związki



BADANIA DIAGNOSTYCZNE



RTG klatki piersiowej - prześwietlenie klatki piersiowej promieniowaniem rentgena; stosowane w celu diagnostyki takich chorób jak: nowotwory, zapalenie płuc, gruźlica



BADANIA DIAGNOSTYCZNE



Spirometria - badanie pojemności płuc polegające na oddychaniu do ustnika pozwalającego mierzyć objętość powietrza wdychanego i wydychanego; stosowana w celu diagnostyki takich chorób jak: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc




BADANIA DIAGNOSTYCZNE



Bronchoskopia - endoskopowe badanie wnętrza układu oddechowego: nowotwory, usuwanie przedmiotów.

Podczas badania można pobrać również materiał do badań histopatologicznych.





Dziękuję



Pobrano: root@... - 6.06.2026